

本試題有是非及選擇各 50 題，共 100 題，每題 1 分，計 100 分，測試時間為 100 分鐘。

是非題採倒扣計分，答錯 1 題，倒扣 0.5 分，但以扣完該部分分數為限。 准考證號碼：

另附有答案卡，請在答案卡上作答。

姓 名：

一、是非題：

- 1.(O) 燙髮可使直髮變捲，捲髮變直其過程是物理、化學作用，再配合技術應用。
- 2.(X) 要燙髮質健康、髮長 10 公分以上的頭髮時，用水捲法較為鬆曲。
- 3.(X) 髮尾齊長的頭髮較易逆梳。
- 4.(X) 碘酒藥性強，效果比優碘好，可塗抹於口、鼻、眼之黏膜上。
- 5.(X) 垂直挾髮的剪髮效果不受剪髮層次高低的影響。
- 6.(X) 染髮時，調配染劑及過氧化氫的比例皆為 1：1。
- 7.(O) 化粧品如在不衛生的情況下分裝，易引起污染而導致變質。
- 8.(X) 紮止血帶的部位必須露出，不可用衣物覆蓋，而且每 30 分鐘放鬆一次。
- 9.(X) 為減少髮量，粗硬髮質宜在近髮根處疏剪。
- 10.(O) 以酸劑處理假髮，目的是使頭髮柔軟。
- 11.(O) 雖然傳染病有不同的傳染方式，但只要維護營業場所整潔、通風良好，避免蚊蟲孳生，維持個人良好的生活及衛生習慣，使用消毒的器械，均可減少傳染病傳播的可能。
- 12.(O) 潤絲精的使用有助於梳髮操作較順暢。
- 13.(X) 指推波紋一定要用髮膠來固定成形，所以髮膠的用量要多一點，以防止散開並增加持久性。
- 14.(X) 倒 V 線髮型是屬離心式的髮型設計。
- 15.(O) 肺結核的病原體為細菌。
- 16.(X) 打薄頭髮時削刀垂直於髮片。
- 17.(O) 若指甲受傷並傷及指甲床，則會導致指甲的畸形生長。
- 18.(O) 凡由某種病原體所引起的疾病，由一人以直接或間接方式傳給他人，或由動物傳至人體的疾病，都叫做「傳染病」。
- 19.(O) 燙髮時捲棒的粗、細應與頭髮長度成正比。
- 20.(O) 指甲分離是由於指甲床與指甲體之間產生空隙所致。
- 21.(O) 使用平捲整髮不易梳出膨鬆有量感的髮型。
- 22.(O) 因不明原因引起的禿頭，常受遺傳影響，稱早年禿頭。
- 23.(X) 八字形包紮法多用於粗細相同的肢體。
- 24.(O) 1960 年代以前在髮型設計上大多運用削刀修剪。
- 25.(O) 連續性波浪髮型最易表現律動的效果。
- 26.(O) 假髮要在陽光下曬乾，應把髮網翻上以免髮絲曝曬褪色。
- 27.(X) 毛髮缺乏任何維生素時，將它塗抹在頭皮上，由皮膚吸收，以達補充及改善之目的。
- 28.(X) 分析髮色的色調，應先比較髮尾再比較髮根。
- 29.(X) 早晨是皮膚最容易吸收養份的時段。
- 30.(X) 為了支撐及平衡身體重量與保持良好的姿態，美髮師應穿高跟鞋工作。
- 31.(X) 毛髮是由髮根吸收營養再輸送至毛髮各部位。
- 32.(O) 物品上附著之油污、毛髮、應先予清除，以免降低消毒效果。
- 33.(X) 化粧品係僅供外用不得口服，故存放地點可以不必考慮日光直射或高溫多濕之處。

- 34.(O) 將削刀放在髮片內側，由髮根至髮尾削薄髮量的是內斜削法。
- 35.(O) 眉毛的生長期約為 5 6 個月。
- 36.(X) 皮膚表皮的結構由內而外是基底層 顆粒層 有棘層 透明層 角質層。
- 37.(X) 流感疫苗是用來預防感冒。
- 38.(X) 臉部按摩時應以指腹逆著紋理方向進行。
- 39.(O) 瀏海是解決額頭太高最好的方法。
- 40.(X) 染髮前的皮膚測試，至少應保持 12 小時。
- 41.(X) 氯液消毒法是運用氯的溶解能力，使病原體產生溶解作用，致病原體死亡。
- 42.(X) 毛髮呈酸性時，可使表皮鱗片張開，達到燙髮及染髮之目的。
- 43.(X) 半永久性染髮劑只能把頭髮染淺，不能染深。
- 44.(X) 香菇頭的豐厚感在於頭頂部。
- 45.(X) 為了方便操作，美髮院將熱水器應裝設於沖水台旁。
- 46.(O) 下樓梯時宜男士在前、女士在後、幼者在後，長者在後，以策安全。
- 47.(X) 在施加漂淡劑時動作不可太快，以免色度不均勻。
- 48.(O) 人體的眼睛、耳朵、手等是典型對稱的均衡。
- 49.(X) 以夾捲作出波紋時，髮圈的直徑應與波紋的寬度等長。
- 50.(X) 冷燙上捲棒中，髮片的角度、張力可依需要而變動。

## 二、選擇題：

- 1.(2) 假髮套在假頭殼後 隨便固定 必需在邊緣固定 只需一個地方固定 不必要固定。
- 2.(2) 母親感染淋病，未經妥善治療，其新生兒經產道受感染可能導致： 耳聾 眼炎 喉嚨發炎 疝氣。
- 3.(4) 指推波紋下面第一層的夾捲，應採用 抬高捲 螺旋捲 雕刻捲 平捲。
- 4.(2) 女性荷爾蒙 男性荷爾蒙 維生素 酸性潤髮劑 有抑制頭髮生長作用。
- 5.(3) 欲將頭髮漂淡 2 3 度，宜使用 3% 6% 9% 12% 的過氧化氫。
- 6.(2) 大層次長髮型不易乾或不易梳理的主要原因是 髮量過多 剪髮技巧不夠精密 頭髮太細 頭髮太軟。
- 7.(1) 運用量最多重設計樣的髮型是 高層次 低層次 邊緣層次 一層次。
- 8.(1) 染髮時，所取髮束厚度約為 1 公分 2 公分 3 公分 4 公分。
- 9.(1) 燙髮用還原劑為使成型較快，宜塗佈後： 蓋塑膠帽 包毛巾 上蒸氣 用熱水泡熱再塗佈於髮捲。
- 10.(4) 夾捲底盤的形狀有 1 種 2 種 3 種 3 種以上。
- 11.(4) 下列何者傳染病到目前為止尚無疫苗，也無特效藥： 肺結核 癩病 梅毒 愛滋病。
- 12.(4) 白色毛巾、布類不宜以何法消毒 煮沸 漂白水 流動蒸氣 煤餾油酚肥皂液。
- 13.(1) 婦女眉目間飾有金銀五彩花子珠的是 花鈿 妝靨 勒子 步搖。
- 14.(3) 以夾捲作出波紋時，髮圈直徑的長度應是波紋寬的 1/2 1/3 2/3 同長。
- 15.(2) 陽性肥皂液屬於陽離子界面活性劑之一種，其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉為蛋白質會被 氧化作用 溶解作用 凝固作用 變質作用。
- 16.(3) 比較三種髮質由快至慢的燙髮速度，正確的是： 抗拒、受損、正常 受損、抗拒、正常 受損、正常、抗拒 正常、受損、抗拒。
- 17.(3) 連續扭轉髮束可剪出 凸狀 凹狀 不規則狀 斜狀。

- 18.(1) 粉膏擦勻後，為固定化粧品宜再用 蜜粉 粉霜 粉條 腮紅 按勻。
- 19.(1) 砂眼和結膜炎的預防方法，那一種是錯誤的？ 按規定接受預防接種 不要共用毛巾或手帕 洗臉盆要經常清洗乾淨 公用毛巾要洗淨並經有效消毒。
- 20.(3) 欲使髮流向後，燙髮時宜採 粽子燙 雨傘燙 扇形燙 挑燙。
- 21.(1) 眼距過窄的情形，常出現在 長形臉 方形臉 圓形臉 心形臉。
- 22.(2) 化學藥品灼傷的處理方法，下列何者錯誤 用大量的清水沖洗受傷部位 沖洗眼睛時，頭不應轉向傷側 灼燒之部位沖洗後用乾淨紗布包紮 迅速送醫。
- 23.(2) 進門禮儀： 聽裡面有聲音就可進去 先敲門等回音才進 直接開門而進 隨意。
- 24.(4) 急救箱要放在 高高的地方 上鎖的櫃子 隨便 固定且方便取用的地方。
- 25.(1) 我國婦女使用假髮最早始於 春秋戰國 明朝 漢朝 民初。
- 26.(1) 關於香港腳之敘述何者為正確？ 由於皮癬菌所引起 由鏈球菌所引起 刺激性皮膚炎之俗稱 過敏性皮膚炎之俗稱。
- 27.(3) 簡易的補粧法宜採用 粉霜 粉條 粉餅 水粉餅。
- 28.(1) 通常判斷頭髮的量感主要在於其 密度 硬度 長度 色彩。
- 29.(4) 瓦斯漏氣，有濃味但未起火時，應打開 抽油煙機 電燈開關 電風扇 門窗。
- 30.(3) 供應來源不明的染髮劑，處新台幣 二十 十五 十 五 萬元以下罰鍰。
- 31.(3) 一流的技術者更須要 甜言蜜語 穿著華麗 謙恭有禮 自傲自信。
- 32.(1) 羽毛式髮型是 向心 離心 中心 外心 性的髮型設計。
- 33.(1) 在營業場所，接觸傳染之途徑： 顧客和從業人員間可能雙向傳染 僅可能由顧客傳給從業人員 可能由從業人員傳給顧客 必須經由未經消毒的器械，媒介始可能發生，人與人直接接觸不會傳染。
- 34.(4) 髮筒捲 直立捲 夾捲 指推波紋 最能表現出連續 S 形律動感。
- 35.(2) 在工作中員工不幸遭遇職業傷害時，員工若在 一年 二年 三年 四年 內沒有提出請求賠償，則視同放棄。
- 36.(3) 最早的植物性染劑是 甘菊 鼠尾草 指甲花 大黃。
- 37.(1) 頭髮受損者保養時應選用 護髮油 酒精 面霜 膠水。
- 38.(2) 健康的指甲是呈 深紅色 淡粉紅色 紫色 黃色。
- 39.(3) 較適合髮根燙的頭髮是 病變髮 豐厚髮 細少髮 叉髮。
- 40.(1) 對於頭蝨之描述，何者錯誤？ 隨著衛生環境改善，頭蝨感染已經在台灣消失 頭蝨是一種體外寄生蟲，生活在擁擠且衛生條件較差的環境下 頭蝨是一種棕灰色，6 隻腳，沒有翅膀，類似芝麻大小的昆蟲 使用感染頭蝨者用過的梳子、毛巾、頭巾、髮帶、衣物、戴過的帽子、睡過的床鋪、枕頭等，有可能被傳染。
- 41.(2) 修剪富波浪變化的髮型，宜用 直削法 斜削法 方形剪法 漸長剪法。
- 42.(1) 毛髮的張力和彈性來自 皮質層 色素層 薄皮層 髓質層。
- 43.(1) 營業場所注意空調及其冷卻水塔之定期清洗、消毒維護、可避免何種傳染病： 退伍軍人症 破傷風 鼠疫 肝炎。
- 44.(3) 香菇頭的豐厚感在於 整個頭部 頭頂部 後頭部 左右兩側。
- 45.(4) 四方型臉的臉頰兩側宜用 外心 中心 離心 向心 式的髮型設計。
- 46.(4) 指甲變成白色點狀是由於 缺血 缺氧 發炎 空氣進入 所致。
- 47.(2) 頭髮的間充物質若流失過多時，與下列何者無關？ 頭髮的乾濕 生長的快慢 多孔性毛髮 分叉或斷落。

- 48.(1) 燙髮用的冷燙紙，最好是使用具有 滲透性 無孔 防水 中性 的紙。
- 49.(3) 比較不傷髮質的是 鹼性髮品 中性髮品 弱酸性髮品 強酸性髮品。
- 50.(1) 古埃及貴族的假髮設計是使用 人髮 細 絹 麻。