

本試題有是非及選擇各 50 題，共 100 題，每題 1 分，計 100 分，測試時間為 100 分鐘。

是非題採倒扣計分，答錯 1 題，倒扣 0.5 分，但以扣完該部分分數為限。 准考證號碼：
另附有答案卡，請在答案卡上作答。 姓 名：

一、是非題：

- 1.(X) 訂做真人用的假髮時，只需按照標準模型去做即可。
- 2.(O) 欲剪均等式髮長，宜持縱髮片剪髮。
- 3.(O) 用指頭搔頭，挖鼻孔、擦拭嘴巴或以唾液潤濕手指點鈔票均為不良的衛生習慣。
- 4.(O) 通常白髮是一種老化過程，它是由於在毛球內的色素胚母細胞衰退而停止色素粒子所致。
- 5.(X) 冷燙液第一劑中的阿摩尼亞，具有嗆鼻臭味與不揮發的特性。
- 6.(X) 二股扭轉編結呈現的是階梯式律動。
- 7.(O) 髮型設計，以整個頭形和面貌上之特性為設計基礎。
- 8.(X) 用滑剪法剪髮可使用頭髮的差距銜接但不能使髮型完美。
- 9.(O) 燙髮時捲棒的粗、細應與頭髮長度成正比。
- 10.(X) 毛髮賴以成長的營養，大部份是從皮膚細胞中獲得。
- 11.(X) 流行性感冒、B 型肝炎和足癬的病原體都是細菌。
- 12.(O) 油類火災宜使用泡沫及乾粉滅火器。
- 13.(X) 全頂髮笠依製造方法可分為人髮製品與化纖製品二種。
- 14.(X) 頭髮的軟硬度、吸水性、彈性及強韌度之差異，與先天性髮質無關。
- 15.(O) 被強酸、強鹼灼傷時，應趕緊用大量的清水沖洗受傷部位，再按燙傷處理法處理，且不要在尚未痊癒前直接曝曬陽光。
- 16.(X) 刀類等金屬物品，不宜以紫外線消毒，以免刀鋒變鈍。
- 17.(X) 通常皮脂腺的大小和毛髮的粗細成正比，毛髮較粗的地方皮脂腺也較大。
- 18.(X) 順時針方向的平捲，應從右邊捲起。
- 19.(X) 慢性肺病患者的指甲易形成甲脆裂。
- 20.(X) 指甲上有橫紋、縱紋或變厚時，則不易斷裂。
- 21.(O) 肺結核病最主要的原因是因為受到肺結核病人傳染，吸入結核菌所引起的疾病。
- 22.(O) 自然黑髮漂淡其顏色淡化的順序是：黑→褐→紅→金紅→金黃→黃→淺黃。
- 23.(O) 夾捲時挑弧形底盤，大都是使用在側面或頭部背面。
- 24.(X) 毛乳頭形成毛髮，故被稱為「毛髮之母」。
- 25.(O) 中風的原因是由於腦部的血管有了局部性的阻塞或出血而發生各種症狀與徵象。
- 26.(X) 中性肌膚是不會有過敏現象。
- 27.(O) 有傷口或擦傷之頭皮，不可染髮。
- 28.(X) 指推波紋下面的夾捲應採用抬高捲。
- 29.(O) 剪均衡髮型時，兩側角點與頸側點長度要相同。
- 30.(X) 過氧化氫的濃度對髮質及頭皮並不造成損壞。
- 31.(X) 使用過氧化氫染劑染髮時，應加熱以加速氧化反應。
- 32.(X) 為減少髮量，粗硬髮質宜在近髮根處疏剪。
- 33.(O) 為了使波紋持久，做波紋成形時的方向應與毛流的長向一致。
- 34.(O) 黑色素細胞可防止黑色素侵入皮膚深層。

- 35.(O) 從業人員為增進衛生常識，以維護顧客健康，應定期參加衛生講習。
- 36.(O) 產婦如患有淋病，分娩時嬰兒經過產道，眼睛可能被傳染導致失明。
- 37.(X) 頭髮打薄不影響頭髮長度及量感。
- 38.(X) 頭髮的組成胺基酸中，最重要的是甘胺酸，其含量會依人種而異。
- 39.(O) 人體的眼睛、耳朵、手等是典型對稱的均衡。
- 40.(O) 一個人是否感染病菌，不一定能由其外表察知，因此服務每位顧客後，均應嚴格實施雙手清潔及器具消毒。
- 41.(O) 美髮師本身的技術及服務態度，經常是美容院最經濟有效的廣告。
- 42.(O) 臉部按摩應順著肌肉紋理方向進行。
- 43.(O) 化粧品用之得當，是美容聖物；用之不當，是毀容毒品。
- 44.(X) 抗拒性頭髮，宜採用水捲髮燙髮。
- 45.(X) 正三角型臉的額頭具有離心感。
- 46.(X) 電擊休克發生時，應即刻用手將傷者拉離電源以免造成死亡。
- 47.(O) 合成染劑是指由植物染料與一些金屬鹽及其它染料的合成物。
- 48.(O) 染髮劑的色度是指顏色的深淺，其數值愈小，顏色愈深。
- 49.(X) 冷燙捲髮時若髮尾集中其波浪較均勻。
- 50.(X) 洛可可風格時期的髮型具有浪漫氣氛、優美纖細。

二、選擇題：

- 1.(3) 二股扭轉編髮是①水平式②階梯式③移轉式④跳躍式 的律動。
- 2.(4) 止血帶不可用①領帶②領巾③長襪④電線 來代替，以免不易解開，而傷及皮膚和組織。
- 3.(3) 以電棒將髮尾平整夾緊後，往外翻轉定型後的效果為①波浪型②捲捲型③外翹型④內彎型。
- 4.(2) 頭型大且頭髮短少者較適合採用①標準式②疊磚式③扇形式④雨傘式 燙髮。
- 5.(1) 改善乾燥的指甲根部表皮可使用①表皮膏②祛光劑③研磨劑④緩和劑。
- 6.(3) 蛋殼形指甲可能是全身的慢性疾病或①呼吸系統疾病②循環系統疾病③神經系統疾病④肌肉組織疾病 所引起。
- 7.(2) 毛髮的生長速度每天約① 0.03~0.04 毫米② 0.3~0.4 毫米③ 3~4 毫米④ 30~40 毫米。
- 8.(1) 住家或營業場所周圍至少①二公尺②二十公尺③一百公尺④二百公尺 範圍內之騎樓道路巷弄及排水溝，應由住家或商家負責清掃。
- 9.(4) 指推波紋下面第一層的夾捲，應採用①抬高捲②螺旋捲③雕刻捲④平捲。
- 10.(4) 對於結核病之描述，何者正確？①結核菌只侵害人體肺部②結核病是一種叫結核球病毒所引起的疾病③肺結核病是因為過勞、營養不良或者是「肺部受傷」所引起④肺結核病最主要的原因是因為受到肺結核病人傳染，吸入結核菌所引起的疾病。
- 11.(2) 頭髮表皮鱗片愈張開，則燙髮所需時間①較長②較短③不受影響④依髮長而定。
- 12.(3) 燙髮時鬢度的波紋大小決定於①時間的長短②藥劑的強弱③捲棒的大小④角度的高低。
- 13.(2) 將假髮用丁字針固定在假頭殼時，在臉際線除了側角點外，至少應在①側部點②中心點③前側點④側角點 固定。
- 14.(2) 酒精的有效殺菌濃度，對病原體殺菌機轉為①氧化作用②蛋白質凝固作用③還原作用④蛋白質溶解作用。
- 15.(1) 梳開纏結的頭髮，應從①髮尾至髮根②髮根至髮尾③髮中至髮尾④髮中至髮根 梳開。
- 16.(1) 補染新生的白髮宜從①前頭部②後頭部③側頭部④後頸部 開始染。
- 17.(1) 關於香港腳之敘述何者為正確？①由於皮癬菌所引起②由鏈球菌所引起③刺激性皮膚炎之俗

稱④過敏性皮膚炎之俗稱。

- 18.(3) 選購髮笠時，以適合於使用者的①髮質②髮色③頭寸④鬢曲度 為第一要件。
- 19.(3) 噴霧型染劑是屬①永久性染劑②半永久性染劑③暫時性染劑④金屬性染劑。
- 20.(4) 控制汗腺排汗的是①血液循環系統②肌肉系統③呼吸系統④神經系統。
- 21.(1) 氫液消毒法是運用氫的何種能力①氧化作用②蛋白質凝固作用③蛋白質變化作用④蛋白質溶解作用，破壞其新陳代謝機轉，致病原體死亡。
- 22.(3) 造成房屋傾倒、山崩、地裂、地層斷陷的地震是①二級②四級③六級④八級。
- 23.(2) 陽性肥皂液屬於陽離子界面活性劑之一種，其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉為蛋白質會被①氧化作用②溶解作用③凝固作用④變質作用。
- 24.(3) 識別理髮院的三色燈是一種①水平式②階梯式③移轉式④跳躍式 的律動。
- 25.(1) 燙髮完成後，發覺頭髮溼時很鬆，乾時鬆弛且毛毛，此現象顯示①使用藥劑時間過久②燙髮不完全③使用過多藥水④使用過多髮油。
- 26.(1) 推剪時剪刀與梳子宜成① 0°② 45°③ 60°④ 90°。
- 27.(4) 髮型正面造型的最大範圍，是以眉間為圓心至①眼②鼻③嘴④下巴 為半徑，所畫的圓周內。
- 28.(1) 後頸線為尖毛髮者，要剪短髮時，其輪廓線宜設計① V 字形②波浪形③圓弧形④方形。
- 29.(1) 製造使用在黏膜上的化粧品之色素，應採用：①第一類②第二類③第三類④第四類。
- 30.(3) 染髮前除了要檢查髮質外還要觀察①頭髮長度②頭髮粗細③頭皮是否損傷④頭髮是否自然捲。
- 31.(2) 毛髮開始生長於人體的時期，可溯至胎兒①一個月②三個月③五個月④七個月。
- 32.(1) 一人施救心肺復甦術胸外按壓的速度約①每分鐘 80~100 下②每分鐘 15 下③每分鐘 60 下④每分鐘 120 下。
- 33.(3) 指推波紋的波紋走向，基本上可分為水平、垂直及①逆毛流②順毛流③對角④交替。
- 34.(1) 燙髮用劑中以硫醇基乙酸(Thioglycolic acid)為主成分之冷燙劑其 PH 值不得低於① 4.5 ② 7 ③ 9.6 ④ 11。
- 35.(2) 以扭轉髮片剪法可剪出①凸狀②凹狀③齒狀④斜狀。
- 36.(4) 美髮工作人員，應避免的行為是：①誠實、公平②負責、盡職③和藹、有禮④工作敷衍。
- 37.(2) 正常情況下，每日脫落的頭髮數約① 20 根以下② 50~100 根③ 100~200 根④ 200 根以上。
- 38.(2) 指推波紋是①水平式②階梯式③移轉式④跳躍式 的律動。
- 39.(1) 頭皮屑是頭皮①角質層②顆粒層③有棘層④基底層 不斷剝落所造成。
- 40.(4) 頭髮表皮層中含有保護毛髮內部的細胞呈①纖維狀②圓形狀③長形狀④鱗形狀。
- 41.(2) 合宜的圍巾是保護顧客①名譽與名聲②皮膚與衣服③自尊與信心④美麗與榮耀。
- 42.(4) 不適合打薄的頭髮區域是①頭頂部②頭冠部③ U 型區④髮際周圍。
- 43.(1) 營業場所注意空調及其冷卻水塔之定期清洗、消毒維護，可避免何種傳染病：①退伍軍人症②破傷風③鼠疫④肝炎。
- 44.(4) 造型效果較佳的剪法是採用①等長②水平③高層次④綜合 的剪法。
- 45.(3) 細菌之基本構造，在菌體最外層為①細胞膜②細胞質③細胞壁④細胞核。
- 46.(4) 美容院應在電話旁放置：①急救手冊②消防隊電話③警局電話④急救手冊、消防隊、警局、救護車及醫院電話。
- 47.(1) 酸性燙髮藥水是利用下列何者使其達到催化作用？①熱②氫③阿摩尼亞④單乙醇銨。
- 48.(3) 卸粧時，應從①雙頰②額頭③嘴唇④下顎 部位先行卸粧。
- 49.(1) 推剪時，剪刀的刀口與髮片宜呈① 90°② 60°③ 45°④ 0°。

50.(2) 殺菌之穿透力易受外物影響而降低消毒效果之設備為①高壓蒸汽滅菌鍋②紫外線消毒箱③煮鍋④蒸汽箱。