

097 年度 06700 女子美髮乙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

- 1.(3) 在使用化學性的洗直劑前，必須先了解頭髮的①密度及長度②密度及髮流③髮質及彈性④髮色及長度。
- 2.(4) 頭髮的組成胺基酸中，最重要的是①精胺酸②甘胺酸③絲胺酸④胱胺酸。
- 3.(1) 設計正面頭髮髮流和造型，宜以①額頭②眼睛③鼻子④下巴 為主體。
- 4.(2) 脫髮部位頭皮平滑、沒有發紅或頭皮屑現象的是①自然脫髮②圓形脫髮③牝糠性脫髮④脂漏性脫髮。
- 5.(4) 剪髮時首要做的是①分髮線②導線③基準線④分區。
- 6.(1) 依傳染病防治條例，營業場所負責人發現顧客有疑似傳染病應於何時報告衛生單位① 24 小時內② 48 小時內③一週內④勿須報告。
- 7.(1) 維生素① A ② B ③ C ④ E 能防止指甲脆裂。
- 8.(2) 為形成水平式波紋，而做順時鐘方向平捲時，髮流宜先梳成呈①正 C ②反 C ③斜 C ④一直線。
- 9.(4) ①健康狀況②營養的攝取③年齡④血液 並不影響指甲生長速度。
- 10.(2) 欲配製 6%煤餾油酚肥皂液 0.5 公升需取含 25%甲苯酚之煤餾油酚原液多少 c.c? ① 6 ② 60 ③ 25 ④ 250。
- 11.(2) 傳染病的發生，不必具備的條件為①須有適當的傳染途徑②須有疫苗來接種③須有病原體的存在④須有抵抗力較弱的身體。
- 12.(1) 指推波紋是將頭髮梳成① S 型② 8 字形③ M 型④ C 型。
- 13.(4) 皮膚老化角質的脫落週期約為① 7 天② 14 天③ 21 天④ 28 天。
- 14.(4) 剪髮時，定引導線的位置①在頭頂部②在頸背部③在耳側部④不一定。
- 15.(2) 通常皮膚表面的皮脂呈①弱鹼性②弱酸性③強酸性④強鹼性 時，可抑制細菌在皮膚表面繁殖。
- 16.(1) 乾毛巾以何種方法消毒最為適當? ①煮沸②漂白水③來蘇水④蒸氣。
- 17.(4) 表現青春活潑的眼部化粧，色彩宜用①寶藍②咖啡③深紫④橙色。
- 18.(2) 美容院最節省最有效的廣告是①報紙廣告②美髮師技術③宣傳車廣告④傳單廣告。
- 19.(3) 髮型側面造型的最大範圍是以太陽穴為圓心至①鼻子②嘴角③下巴④頸部 為半徑，所畫的圓周內。
- 20.(1) 酸性燙髮藥水是利用下列何者使其達到催化作用? ①熱②氨③阿摩尼亞④單乙醇銨。
- 21.(1) 影響毛髮的健康最大的維生素是① B 群② D 群③ E ④ F。
- 22.(1) 夾捲在頭皮上固定的部份稱為①底盤②髮幹③圓環④髮束。
- 23.(2) 與顧客交談時應忌諱的是①適度讚美對方的服飾②批評他人的手藝③傾聽對方的傾訴④適當表達自我的信心。
- 24.(4) 在頭皮及頭髮上經常出現白色細小的鱗片是下列何者的徵兆①頭皮②濕疹③禿頭症④頭皮屑。
- 25.(3) 時常在路邊攤吃東西，喜食未經煮熟食物、生菜，可能感染① B 型肝炎②淋病③ A 型肝炎④砂眼。
- 26.(1) 燙髮完成後，發覺頭髮溼時很鬆，乾時鬆弛且毛毛，此現象顯示①使用藥劑時間過久②燙髮不完全③使用過多藥水④使用過多髮油。

- 27.(1) 古埃及貴族的假髮設計是使用①人髮②細③絹④麻。
- 28.(2) 大腦細胞只要缺氧①一分鐘②四分鐘③三分鐘④卅秒 就開始會壞死。
- 29.(3) 盤垣髻流行於①春秋戰國②秦漢③晉朝④三國 時期。
- 30.(3) 造成房屋傾倒、山崩、地裂、地層斷陷的地震是①二級②四級③六級④八級。
- 31.(2) 皮膚試驗呈現紅腫與癢的現象是①陰性反應②陽性反應③中性反應④不確定反應。
- 32.(4) 具有往內蓬鬆效果的設計剪法是①高層次②中層次③低層次④無層次。
- 33.(2) 非水溶性的易燃化學物品之處理應①倒入水溝沖掉②用抹布吸起再燒掉③應在密閉式的空間④用水沖洗。
- 34.(3) 製造含藥化粧品，應向①縣（市）衛生局②經濟部③行政院衛生署④縣（市）建設局申請製造許可證。
- 35.(4) 對於結核病之描述，何者正確？①結核菌只侵害人體肺部②結核病是一種叫結核球病毒所引起的疾病③肺結核病是因為過勞、營養不良或者是「肺部受傷」所引起④肺結核病最主要的原因是因為受到肺結核病人傳染，吸入結核菌所引起的疾病。
- 36.(1) 在基本冷燙中，若頸背部要造成服貼的效果，則髮片的角度最好在① 30 度② 60 度③ 90 度④ 120 度。
- 37.(1) 對於流行性感冒，上呼吸道感染及肺結核，我們對它的了解下列敘述何者正確①咳嗽、打噴嚏可能傳播②都是急性傳染病③公共場所不易傳染④可以共用毛巾。
- 38.(1) 短髮時欲燙出自然的波紋可用①夾捲②螺絲③拐子④龍鳳 燙。
- 39.(2) 下列何者傳染病非經蚊蟲叮咬傳染？①日本腦炎②愛滋病③瘧疾④登革熱。
- 40.(4) 經常使用電鉗整髮易使①髮質變好②髮質變粗③髮質變細④髮質容易乾燥。
- 41.(3) 若要剪成中心點 10 公分頂部點 5 公分的髮型，頭髮應拉向①頸部點②後部點③頂部點④中心點。
- 42.(2) 下列何者和預防傳染病無關？①接種疫苗②按時吃健康食品③定期健康檢查④作息正常、營養充足。
- 43.(4) 小髮髻之用途最多，尤為增加某部份的①質感②形狀③紋理④量感 時使用。
- 44.(3) 下列洗手方法何者效果最好①用水盆洗手②用沖洗的方法洗手③先把手淋濕，再塗抹肥皂，然後再沖洗④三者效果一樣。
- 45.(4) 側長分髮線適用於額頭①窄矮②窄高③寬高④寬矮 者。
- 46.(3) 側分的髮型，指推波紋應從①頭頂部份②頭部後側③較大的一邊④較小的一邊 著手。
- 47.(1) 未經領得含藥化粧品許可證而擅自輸入含藥化粧品者，可處①一②二③三④四 年以下有期徒刑。
- 48.(2) 挫傷或扭傷後①可加以揉搓以減少疼痛②加壓並冷敷使血管收縮③繼續活動④熱敷。
- 49.(2) 頭髮漂淡劑可使頭髮①增加色素②去除色素③增加亮度④減少亮度。
- 50.(3) 頭髮具有①使頭皮保持油滑②使頭皮保持乾燥③保護頭部④使頭皮屑增加 的功能。
- 51.(1) 假髮自古在①埃及②羅馬③希臘④雅典 就已被戴用。
- 52.(4) 在燙完頭髮後需要① 12 小時② 24 小時③ 36 小時④ 72 小時後 才能使頭髮的組織穩定。
- 53.(1) 羽毛式髮型是①向心②離心③中心④外心 性的髮型設計。
- 54.(3) 向右斜長的瀏海，頭髮應拉往①右前方②右側方③左前方④左側方 修剪。
- 55.(2) 皮膚的附屬構造包含毛髮、汗腺、皮脂及①血管②指甲③運動神經纖維④淋巴腺。
- 56.(3) 設計側面頭髮髮流和造型，宜以①眉尾②耳朵③太陽穴④頸部 為中心。
- 57.(1) 為避免懷孕之員工感染後導致流產或新生兒先天缺陷，應鼓勵女性員工及早完成何種疫苗接

種①德國麻疹②B型肝炎③A型肝炎④卡介苗。

58.(4) 冷燙第一劑主要是切斷①鹽鍵②氨基鍵③氫鍵④二硫化鍵。

59.(3) 尋常性痤瘡或稱①汗疹②汗斑③青春痘④麥粒腫。

60.(3) 在集合場所作多數人介紹時①先尊後卑②先卑後尊③先介紹自己④先介紹女士。

61.(4) 下列何者為導電體①塑膠②木棒③玻璃④人體。

62.(2) C線的髮型設計表現①復古②青春③華麗④柔媚。

63.(2) 一般染髮，宜使用①3%②6%③9%④12%的過氧化氫。

64.(4) 頭頂部髮量豐厚的髮型宜採用①正斜②水平③圓弧④逆斜剪法。

65.(1) 美容院最少應裝置①2具②3具③4具④5具以上之滅火器。

66.(4) 抽血檢驗，可幫助確定受檢人是否感染①結核病②癩病③淋病④梅毒。

67.(2) 夾捲的方向及可動性主要來自①底盤②髮幹③圓環④髮束。

68.(1) 剪前面時要連接順暢髮片要往①中心②上③下④後拉剪。

69.(1) 將削刀壓放在夾有髮片的中指上，整齊切斷髮尾的是①直削法②斜削法③橫削法④縱削法。

70.(2) 毛髮的生長速度每天約①0.03~0.04毫米②0.3~0.4毫米③3~4毫米④30~40毫米。

71.(4) 下列何者不會影響化學藥品殺菌力因素？①欲消毒器具表面的乾淨度②濃度正確與否③適當浸泡消毒時間④器材價值高低。

72.(4) 下列過氧化氫的敘述何者為正確？①濃度愈高，鹼性愈強②濃度愈高，染得愈深③濃度愈低，造成髮質吸水性愈強④兼具漂淡及軟化作用。

73.(1) 人髮的燃燒速度與合成之假髮比較①慢②快③相同④視髮質而定。

74.(1) ①金屬②植物③氧化④非氧化性染髮劑，使用後髮色較無光澤。

75.(4) 手指纖細者，指甲的形狀較適合修剪成①方形②圓形③尖形④橢圓形。

76.(1) 補染新生的白髮宜從①前頭部②後頭部③側頭部④後頸部開始染。

77.(3) 流感疫苗是用來預防何種疾病？①傷風②感冒③流行性感冒④流行性感冒嗜血桿菌。

78.(3) 身體內荷爾蒙的變化會造成油脂與水分的不足，而使皮膚①乾燥②光滑與柔順③乾燥與皺紋④出現青春痘。

79.(2) 頭髮的色素粒子，大都存在於頭髮的①表皮層②皮質層③髓質層④毛根梢。

80.(3) 流行性感冒是由何種病原體所引起的①細菌②黴菌③病毒④原生蟲。