

098 年度 06700 女子美髮乙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (3) 盤垣髻流行於①春秋戰國②秦漢③晉朝④三國 時期。
2. (1) 為形成水平式波紋，做逆時鐘方向平捲時，髮流宜先梳成呈①正 C②反 C③斜 C④一直線。
3. (1) 頭髮的營養來自頭髮的毛乳頭，因為它含有①微血管②肌肉③腺體④脂肪 組織。
4. (2) 健康的指甲是呈①深紅色②淡粉紅色③紫色④黃色。
5. (4) 營業場所通風不良，可能傳染①登革熱②日本腦炎③霍亂④肺結核。
6. (3) 選購全頂髮笠應最注重①顏色②髮質③尺寸大小④價格。
7. (3) 急救箱內應備有①氨水②白花油③優碘④紅藥水 來消毒傷口。
8. (4) 下列何者為導電體①塑膠②木棒③玻璃④人體。
9. (3) 若製造足以影響人體生理機能之產品，則應依①醫療法②化粧品衛生管理條例③藥事法④醫師法 辦理。
10. (4) 操作電棒為免燙傷頭皮，在頭皮與電棒間宜置入①排骨梳②九排梳③S 梳④電木梳。
11. (2) 臉大而扁的圓形臉髮型設計應加高①瀏海②頭頂③兩側④鬢角 部份達到修正臉型的效果。
12. (3) 蛋殼形指甲可能是全身的慢性疾病或①呼吸系統疾病②循環系統疾病③神經系統疾病④肌肉組織疾病 所引起。
13. (4) 節能的室內溫度為攝氏①12~16 度②16~20 度③20~24 度④24~28 度。
14. (3) 兩側髮流往後時，持髮角度宜①往上②往下③往前④往後 拉剪。
15. (4) 下列何者傳染病到目前為止尚無疫苗，也無特效藥①肺結核②癩病③梅毒④愛滋病。
16. (2) 頭髮的色素粒子，大都存在於頭髮的①表皮層②皮質層③髓質層④毛根梢。
17. (1) 頭髮的①表皮層②皮質層③髓質層④基底層 可防止其水分過分流失。
18. (3) 在使用化學性的洗直劑前，必須先了解頭髮的①密度及長度②密度及髮流③髮質及彈性④髮色及長度。
19. (4) 雙人心肺復甦術，胸外按壓與人工呼吸的次數比例是①20：1②20：2③30：1④30：2。
20. (3) 左右同形、同量的髮型，宜採用①不分髮線②側分髮線③中分髮線④橫分髮線。
21. (1) 理燙髮營業場所之用水以何者為佳①自來水②地下水③井水④泉水。
22. (2) 漂髮由黑髮到白髮的顏色變化過程中第七步驟的顏色變化為①黑色②黃白色③黃色④褐(棕)色。
23. (3) 時常在路邊攤吃東西，喜食未經煮熟食物、生菜，可能感染①B 型肝炎②淋病③A 型肝炎④砂眼。
24. (3) 黑色素細胞是以下列何種胺基酸作為原料？①麩胺酸②離胺酸③酪胺酸④胱胺酸。
25. (1) 倒 V 線的髮型是①向心②離心③外心④中心 式的髮型設計。
26. (2) 冷燙液中的乙硫醇酸與①角質纖維②間充物質③表皮層④髓質層 中的二硫化鍵發生反應，而達到燙髮的目的。
27. (2) 與顧客交談時應忌諱的是①適度讚美對方的服飾②批評他人的手藝③傾聽對方的傾訴④適當表達自我的信心。
28. (2) 酒精的有效殺菌濃度，對病原體殺菌機轉為①氧化作用②蛋白質凝固作用③還原作用④蛋白質溶解作用。
29. (1) 在一平面上大小相同的兩點①成水平動向較有安定感②成斜線動向較有安定感③成曲線動向較有安定感④成垂直動向。

30. (3) 酒精取用後，容器宜馬上密蓋，其主要目的為防止①變質②變色③濃度改變④誤食中毒。
31. (1) 理髮店、髮廊私自配製冷燙液，係違反化粧品衛生管理條例，會被處以①一②二③三④四年以下有期徒刑。
32. (1) 面皰肌膚者宜多食用①鹼性②酸性③中性④刺激性 的食品。
33. (2) 金屬性染髮劑的鉛色素氧化後，原白髮部分會變成不雅觀的①紅色②綠色③黃色④藍色。
34. (1) ①髮笠②髮片③小髮髻④馬尾 能遮掩大部分的頭髮。
35. (4) 美髮工作人員，應避免的行爲是①誠實、公平②負責、盡職③和藹、有禮④工作敷衍。
36. (1) 採用上持髮修剪，髮長呈現①上短下長②上長下短③上、下等長④上下不一樣長。
37. (2) 通常運用於髮尾打薄的是①電剪②齒剪③點剪④推剪。
38. (2) 潤絲精中因含有①中性離子②陽性離子③陰性離子④負性離子 能使頭髮之電性平衡，防止頭髮打結。
39. (4) 推剪短髮最好由下列何處開始剪起？①中心點②頂部點③黃金點④頸部點。
40. (4) 消毒的目的，下列何者為錯誤？①保障客人健康②保障從業人員健康③殺滅物體上病原體④殺滅物體上所有生物。
41. (2) 一般染髮，宜使用①3%②6%③9%④12% 的過氧化氫。
42. (4) 隔層波紋（脈形捲法）是①夾捲與夾捲②指推波紋與指推波紋③髮筒捲法與指推波紋④指推波紋與平捲的組合設計。
43. (1) 毛髮的活動期，不易受下列何者的影響？①毛髮長度②毛髮健康③食物④內分泌。
44. (3) 側分的髮型，指推波紋應從①頭頂部份②頭部後側③較大的一邊④較小的一邊 著手。
45. (2) 大腦細胞只要缺氧①一分鐘②四分鐘③三分鐘④卅秒 就開始會壞死。
46. (2) 指甲的主要成分是①醣類②蛋白質③脂肪④維生素。
47. (2) 更換期的表皮細胞有再生能力亦有剝落現象，其週期大約為①7~10天②15~28天③20~30天④30~50天。
48. (1) 砂眼和結膜炎的預防方法，那一種是錯誤的？①按規定接受預防接種②不要共用毛巾或手帕③洗臉盆要經常清洗乾淨④公用毛巾要洗淨並經有效消毒。
49. (1) 皮膚由血液中獲得營養，因此良好均衡的①飲食②睡眠③戶外活動④營養面霜 是皮膚健康的最大保障。
50. (3) 永久性染劑與過氧化氫混合時，會產生的化學反應是①軟化②吸熱③氧化④中和。
51. (3) 金屬用具的保養可在消毒後塗抹①汽油②髮油③潤滑油④石油。
52. (3) 黃金後部間基準點的英文簡寫是①C.T.M.P.②T.G.M.P.③G.B.M.P.④N.B.M.P.。
53. (4) 冷燙第一劑的功能是切斷頭髮的二硫化鍵，使其膨脹、軟化而失去彈性，稱為①軟化作用②氧化作用③物理作用④還原作用。
54. (4) 抽血檢驗，可幫助確定受檢人是否感染①結核病②癩病③淋病④梅毒。
55. (3) 把頭髮集中頂部點剪會成①低層次②中層次③高層次④無層次 的髮型。
56. (3) 髮片提45度捲入髮筒時，髮筒落在底盤的①內方②上方③下方④內外各半。
57. (3) 細菌之基本構造，在菌體最外層為①細胞膜②細胞質③細胞壁④細胞核。
58. (2) 短的黑人捲髮表現①直線②渦線③S線④C線 的髮流。
59. (3) 一流的技術者更須要①甜言蜜語②穿著華麗③謙恭有禮④自傲自信。
60. (1) 側角點的英文簡寫是①S.C.P.②F.S.P.③N.S.P.④E.B.P.。
61. (3) 削刀的使用主要以①出力的大小②肩膀的移動③手腕的移動④刀刃的利度 來控制。
62. (4) 蒸氣機水瓶內的石灰質可用①鹽②鹼③酒④醋 去除。
63. (1) 為避免懷孕之員工感染後導致流產或新生兒先天缺陷，應鼓勵女性員工及早完成何種疫苗接種①德國麻疹②B型肝炎③A型肝炎④卡介苗。

64. (4) 皮膚最容易吸收養分的時段為①上午②中午③下午④夜間。
65. (4) 乾性頭皮宜使用①礦物性髮油②高酒精護髮液③鹼性洗髮精④維生素 B 美髮霜。
66. (2) 營業場所從業人員如發現顧客有皮膚病之傳染病①仍可為其服務②應拒絕提供服務③先洗淨其受感染的皮膚再行服務④事後始發現，雙手及器具洗淨即可。
67. (2) 接種疫苗或類毒素，使人體產生①抗原②抗體③病原體④毒素，可免受某種傳染病的感染。
68. (1) 離子夾操作時正確的是①從髮根移至髮尾②直接髮莖中間③直接髮根部④直接從髮尾部開始捲起。
69. (4) 頭髮中色素粒子較小的是①黑色②褐色③紅色④黃色。
70. (2) 不良化粧品可能導致婦女在面頰或額頭產生①肝斑②黑斑③雀斑④老人斑。
71. (1) 五代時（紅妝）盛行（以）高髮，梳成①朝天髻②隨馬髻③靈蛇髻④飛天髻。
72. (1) 鼻出血的止血法是捻緊鼻子軟組織部分，用口呼吸，患者位於坐姿，並使頭①略向前傾②向後仰③抬高④向左偏。
73. (2) 毛髮開始生長於人體的時期，可溯至胎兒①一個月②三個月③五個月④七個月。
74. (4) 使用輕、柔軟、可任意彎曲燙髮用具的是①拐子燙②螺絲燙③車輪燙④萬能燙。
75. (2) ①小髮髻②髮條③髮片④半頂髮笠 可以折成曲狀或圓型來修飾頭髮用。
76. (1) 連續波浪髮型最易表現①律動②均衡③調和④統一。
77. (3) 保持頭皮健康的基本要素就是①按摩②梳刷③清潔④整髮。
78. (2) 脫髮部位頭皮平滑、沒有發紅或頭皮屑現象的是①自然脫髮②圓形脫髮③粗糙性脫髮④脂漏性脫髮。
79. (1) 燙易捲的頭髮適合用①水捲法②護髮捲法③先塗藥捲法④塗藥捲法。
80. (2) 親水性髮質在燙髮時較為①慢捲②快捲③一樣④不一定。