

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (1) 梳開糾纏結的頭髮，應先從①髮尾梳開再梳髮根②髮根梳開再梳髮尾③髮中梳開再梳髮尾④髮中梳開再梳髮根。
2. (2) 刷子類尤其是長毛刷子消毒法宜用①煮沸法②紫外線③流動蒸氣法④煤鹼油酚肥皂溶液。
3. (3) 從業人員的洗手在公共衛生上之意義①目的僅為洗掉其上的髮屑、皮屑②沖洗後身心覺得舒暢③可減少傳播性病原體的機會④飯前、便後洗手即可勿須每一顧客服務後逐一洗手。
4. (1) 在修指甲時，指甲外皮被割傷，應先用①消毒劑②防腐劑③腐蝕劑④小蘇打。
5. (1) 剪前面時要連接順暢髮片要往①臉中心②向上③向下④向後 拉剪。
6. (4) 手指纖細者，指甲的形狀較適合修剪成①方形②圓形③尖形④橢圓形。
7. (2) 毛髮養分來自①皮脂腺②毛乳頭③毛母細胞④細胞核。
8. (4) 嚴重受損髮燙髮時宜用①先塗藥捲法②塗藥捲法③水捲法④護髮捲法。
9. (3) 金屬物品如剪刀，剃刀等，宜以何種方法消毒？①蒸氣②氯液③酒精④陽性肥皂液。
10. (1) 渦線的髮流是屬於①自由曲線②幾何曲線③三角曲線④立體曲線。
11. (2) 髮型設計是以人為對象，以①假髮②頭髮③髮飾④髮竺 為素材形成的創作藝術。
12. (1) 氯液消毒法是運用氯下列何種能力？①氧化作用②蛋白質凝固作用③蛋白質變化作用④蛋白質溶解作用，破壞其新陳代謝，致病原體死亡。
13. (2) 剪髮梳與剪刀的刀刃成平行的剪髮稱為①滑剪②推剪③電剪④削剪。
14. (4) 髮型正面造型的最大範圍，是以眉間為圓心至①眼②鼻③嘴④下巴 為半徑，所畫的圓周內。
15. (1) 煮沸消毒法其水溫及時間、至少應達何種標準以上？①100°C 5 分鐘②100°F 5 分鐘③100°C 5 秒鐘④100°F 5 秒鐘。
16. (3) ①無髮症②圓形禿髮症③老人性脫髮症④乏髮症 非屬先天性脫髮症。
17. (2) 婦女在妊娠的前半期，毛髮的發育特別旺盛，是因①男性荷爾蒙②女性荷爾蒙③甲狀腺荷爾蒙④皮質荷爾蒙 所致。
18. (4) 夾捲底盤的形狀有①1 種②2 種③3 種④4 種以上。
19. (3) 顧客有怨言時宜①陪顧客一起抱怨②對顧客歡心火上加油③當聆聽者④不理不睬。
20. (3) 欲使頭髮流向往後，燙髮時宜採①粽子燙②雨傘燙③扇形燙④挑燙。
21. (2) 頭髮染色在於使頭髮①減少自然色素②增加人工色素③除去大部份色素④增加自然色素。
22. (3) 膚色較白者可選用①偏褐色②較深顏色③較淡色④任何顏色 的染劑。
23. (2) 有關紫外線消毒下列敘述何者為錯誤？①可用來消毒金屬類美髮器具②係屬游離輻射線③其波長愈短殺菌能力愈強④消毒條件為光度強度 85 微瓦特/cm<sup>2</sup> 以上，至少需 20 分鐘。
24. (1) 使用電鉗時，電鉗夾髮處離頭皮至少要有①2.5 公分②4 公分③6 公分④8 公分。
25. (1) 在基本冷燙中，若頸背部要造成服貼的效果，則髮片的角度最好在①30 度②60 度③90 度④120 度。
26. (4) 通常在美容院中發生的是燙傷及①骨頭破碎②腿部傷害③背部傷害④皮膚擦傷。
27. (2) 潤絲精中因含有①中性離子②陽性離子③陰性離子④負性離子 能使頭髮之電性平衡，防止頭髮打結。
28. (3) 細菌之基本構造，在菌體最外層為①細胞膜②細胞質③細胞壁④細胞核。
29. (1) 水平瀏海設計呈現①寬闊②圓闊③豐滿④狹窄 的效果。
30. (2) 指甲變成紫色表示①缺營養②缺氧③感染④發炎。

31. (2) 假髮套在假頭殼上，至少要固定①三個點②六個點③十個點④十二個點。
32. (1) 頭皮屑是頭皮①角質層②顆粒層③有棘層④基底層 不斷剝落所造成。
33. (2) 陽性肥皂液屬於陽離子界面活性劑之一種，其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉為蛋白質會被①氧化作用②溶解作用③凝固作用④變質作用。
34. (3) 按摩可促進表皮中①血液②汗液③淋巴液④皮脂 的循環順暢。
35. (1) 推剪時剪刀與梳子宜成①0°②45°③60°④90°。
36. (3) ①溴酸鉀②溴酸鈉③單乙醇胺④雙氧水 不可做為冷燙第二劑的主劑。
37. (2) 整髮時，塗抹髮膠的最主要功用是在①增加髮量②定型持久③保養髮質④柔軟作用。
38. (4) 冷燙第一劑主要是切斷①鹽鍵②氨基鍵③氫鍵④二硫化鍵。
39. (3) 下列何種消毒非屬於物理消毒法之一？①紫外線消毒②蒸氣消毒③氯液消毒④煮沸消毒。
40. (4) 控制汗腺排汗的是①血液循環系統②肌肉系統③呼吸系統④神經系統。
41. (3) 冷燙液中具有膨脹頭髮、打開毛表皮功能的是①溴酸鉀②溴酸鈉③阿摩尼亞④乙硫醇酸。
42. (3) 冷燙劑第一劑中之 PH 值的強弱，決定頭髮①鬆度②收縮度③膨鬆度④軟硬度 的大小。
43. (2) 頭髮漂淡劑可使頭髮①增加色素②去除色素③增加亮度④減少亮度。
44. (3) 補染過程中當顏色接近原染髮色時，可用洗髮精或①氨水②酒精③水④護髮劑 使髮色更均勻。
45. (4) 潔膚的物理療法過程並不利用①電流②熱氣③紫外線④乳液。
46. (3) 皮膚的色素細胞存在於①角質層②粒狀層③基底層④刺覺層 之中。
47. (1) 握手時要由①長輩②晚輩③平輩④男士 先伸手。
48. (4) 直線分法具有①離心感②向心感③立體感④強而有力感。
49. (2) 夾捲的方向及可動性主要來自①底盤②髮幹③圓環④髮束。
50. (3) 陽性肥皂液與下列何種物質有相拮抗的特性，而降低殺菌效果①酒精②氯液③肥皂④煤鹼油酚。
51. (2) 紫外線在何種範圍內之波長，最具殺菌力？①任何波長殺菌力均一樣②240~280nm③240~280nm④420~820nm。
52. (3) 供應來源不明的染髮劑，處新台幣①二十②十五③十④五 萬元以下罰鍰。
53. (1) 五代時（紅妝）盛行（以）高髻，梳成①朝天髻②隨馬髻③靈蛇髻④飛天髻。
54. (1) 將削刀放在髮片的表面，由髮根至髮尾削薄髮量，是①外斜削法②內斜削法③右斜削法④大斜削法。
55. (1) 在營業場所，接觸傳染之途徑①顧客和從業人員間可能雙向傳染②僅可能由顧客傳給從業人員③可能由從業人員傳給顧客④必須經由未經消毒的器械，媒介始可能發生，人與人直接接觸不會傳染。
56. (3) 美髮師服務顧客的主要責任不包括①防範顧客受傷②提供顧客適當，且專業性的服務③提供顧客心理及生理的治療④使顧客舒適。
57. (2) 接種疫苗或類毒素，使人體產生①抗原②抗體③病原體④毒素，可免受某種傳染病的感染。
58. (3) 使用滅火器時，應將噴嘴對準火焰①尖端②中間③基部④周圍。
59. (4) 四方型臉的臉頰兩側宜用①外心②中心③離心④向心 式的髮型設計。
60. (1) 對於流行性感冒，上呼吸道感染及肺結核，我們對它的了解下列敘述何者正確？①咳嗽、打噴嚏可能傳播②都是急性傳染病③公共場所不易傳染④可以共用毛巾。
61. (1) 水平無層次髮型，其頭髮最長的部位為①頂部點②黃金點③後部點④頸部部。
62. (2) ①電剪②打薄剪③水平剪④推剪 可使髮量減少、髮型膨鬆，並改變平坦、呆板的外型之效果。
63. (1) 毛髮的張力和彈性來自①皮質層②色素層③表皮層④髓質層。

64. (1) 在一平面上大小相同的兩點①成水平動向較有安定感②成斜線動向較有安定感③成曲線動向較有安定感④成垂直動向。
65. (4) 在頭皮及頭髮上經常出現白色細小的鱗片是下列何者的徵兆？①頭皮②濕疹③禿頭症④頭皮屑。
66. (3) 嚴重灼燙傷引起深層組織被破壞的處裡情形①用大量冷水沖至不痛，送醫②把粘在傷處的衣物設法除去③用消毒過的厚紗布敷蓋並固定敷料，送醫④塗抹涼性藥膏。
67. (1) 假髮自古在①埃及②羅馬③希臘④雅典 就已被戴用。
68. (3) 剪一直線髮型時①用力拉緊②提高角度③放鬆梳順④降低角度 才不致使耳下部分產生缺角。
69. (3) 細胞的結構中，控制遺傳的是①細胞膜②細胞質③細胞核④中心體。
70. (4) 前側點的英文簡寫是①N.S.P.②E.B.P.③S.C.P.④F.S.P.。
71. (2) 將假髮用丁字針固定在假頭殼時，在臉際線除了側角點外，至少應在①側部點②中心點③前側點④側角點 固定。
72. (1) 冷燙試捲若稍為不夠鬆時，則可在沖水時①調高水溫②加還原劑③加氧化劑④加第一劑。
73. (3) 調配化學消毒劑時應注意事項敘述何者正確：①先取原液，再加入蒸餾水稀釋②量取溶液時眼與量筒刻度應成垂直位置③若手、眼皮膚接觸具侵蝕性消毒水宜以大量清水沖清④開啓瓶裝原液時瓶蓋應朝下放置。
74. (3) 營業衛生管理之中央主管機關為①省(市)衛生處(局)②行政院環境保護署③行政院衛生署④內政部警政署。
75. (2) 欲配製 100c.c.的 6%來蘇水，則應取用 50%甲苯酚若干 c.c.，再加水至 100c.c.即可①3②6③12④97。
76. (1) 毛髮的粗細與①剪②燙③染④漂 無關。
77. (2) 常用的短髮型逆梳技巧有①2種②3種③4種④5種。
78. (3) 欲將頭髮漂淡 2~3 度，宜使用①3%②6%③9%④12% 的過氧化氫。
79. (1) 改善乾燥的指甲根部表皮可使用①表皮膏②祛光劑③研磨劑④緩和劑。
80. (3) 一般頭髮的直徑為①0~30 毫米②30~60 毫米③60~90 毫米④90~120 毫米。